

---

# PATIËNTENBROCHURE

## IMMUNOTHERAPIE + CHEMOTHERAPIE (CARBOPLATINE + TAXAAN)

---

Uw arts zal een behandeling starten met chemotherapie (carboplatine + taxaan) en immunotherapie.

In deze brochure leggen we uit hoe deze behandeling werkt en overlopen we de bijwerkingen waarvan u last kunt hebben.



# INHOUD

---

<b>Hoe werkt uw behandeling?</b> .....	<b>4</b>
Hoe werkt immunotherapie? .....	4
Hoe werkt chemotherapie? .....	4
<b>Hoe zal uw behandeling worden toegediend?</b> .....	<b>5</b>
<b>Bijwerkingen</b> .....	<b>6</b>
Bijwerkingen tijdens de behandeling .....	6
Meest voorkomende bijwerkingen .....	7
• Risico op infectie (chemotherapie) .....	7
• Blauwe plekken en bloedingen (chemotherapie) .....	7
• Anemie (chemotherapie) .....	8
• Misselijkheid (chemotherapie) .....	8
• Vermoeidheid (chemotherapie + immunotherapie) .....	8
• Haaruitval (chemotherapie) .....	8
• Diarree of buikpijn (chemotherapie + immunotherapie) .....	9
• Constipatie (chemotherapie) .....	9
• Pijnlijke mond (chemotherapie) .....	10
• Verminderde eetlust (chemotherapie) .....	10
• Veranderingen in smaak (chemotherapie) .....	10
• Gevoelloze of tintelende handen of voeten (chemotherapie + immunotherapie) .....	11
• Veranderingen in hormoonconcentraties (immunotherapie) .....	12
• Veranderingen in het gehoor (chemotherapie) .....	12
• Oogproblemen (chemotherapie + immunotherapie) .....	12
• Pijnlijke gewrichten of spieren (chemotherapie + immunotherapie) .....	12
• Effecten op het hart (chemotherapie) .....	13
• Effecten op de longen (chemotherapie + immunotherapie) .....	13
• Hoge bloeddruk (immunotherapie) .....	13
• Veranderingen in de huid (chemotherapie + immunotherapie) .....	13
• Veranderingen in de nagels (chemotherapie) .....	14
• Effecten op de nieren (chemotherapie + immunotherapie) .....	14
• Hoofdpijn (chemotherapie + immunotherapie) .....	14



# HOE WERKT UW BEHANDELING?

## HOE WERKT IMMUNOTHERAPIE?<sup>1</sup>

Immunotherapie is een behandeling die het immuunsysteem stimuleert om kankercellen aan te vallen. Ze zorgt ervoor dat het immuunsysteem kankercellen herkent als vreemde cellen, zoals het dat doet bij bacteriën en virussen. Vervolgens 'ruimen' de immuuncellen de kankercellen 'op'.

De behandeling werkt niet rechtstreeks in op de tumor (zoals gerichte therapie), maar focust op het immuunsysteem zelf. Dit is uniek voor immunotherapie.



<http://www.msinfo.be/emails/videos/2017-11-14-Onco-Patient-Videos/video-nl.html>

## HOE WERKT CHEMOTHERAPIE?<sup>2</sup>

Bij chemotherapie worden geneesmiddelen tegen kanker (cytotoxische geneesmiddelen) gebruikt om kankercellen te vernietigen. Cytotoxisch betekent toxisch (giftig) voor cellen. Cytotoxische chemotherapeutische geneesmiddelen verstoren de manier waarop kankercellen groeien en zich delen.

De meeste chemotherapeutische geneesmiddelen worden opgenomen in de bloedsomloop. Dit betekent dat ze kankercellen om het even waar in het lichaam kunnen bereiken.

Chemotherapeutische geneesmiddelen hebben ook een invloed op bepaalde gezonde cellen in uw lichaam. Deze gezonde cellen kunnen meestal wel herstellen van schade veroorzaakt door chemotherapie. Maar kankercellen kunnen niet herstellen en sterven uiteindelijk af.

Omdat chemotherapeutische geneesmiddelen een invloed kunnen hebben op bepaalde gezonde cellen in uw lichaam, kunt u last krijgen van bijwerkingen. De meeste bijwerkingen verdwijnen na de behandeling.

# HOE ZAL UW BEHANDELING WORDEN TOEGEDIEND?<sup>3</sup>

---

Uw behandeling zal door een oncologisch verpleegkundige worden toegediend in het oncologisch dagziekenhuis.

Voor of op de dag van de behandeling zal een verpleegkundige of een persoon die opgeleid is in het nemen van bloed bij u een bloedstaal afnemen. Dit dient om te controleren of u voldoende bloedcellen hebt om uw behandeling te ondergaan.

Voordat u uw behandeling krijgt, praat u met een arts of verpleegkundige. Zij zullen u vragen hoe u zich de laatste tijd hebt gevoeld. Als uw bloedresultaten goed zijn, zal de apotheker uw chemotherapie voorbereiden. Uw verpleegkundige zal u zeggen wanneer uw behandeling waarschijnlijk klaar is.

Uw verpleegkundige zal u voor de behandeling geneesmiddelen tegen misselijkheid (anti-emetica) geven.

## BIJWERKINGEN

---

In deze rubriek leggen we de meest voorkomende bijwerkingen van deze behandeling uit. We bespreken ook enkele minder gebruikelijke bijwerkingen. U kunt last hebben van enkele van de vermelde bijwerkingen, maar u zult ze vermoedelijk niet allemaal krijgen.

U kunt ook bijwerkingen krijgen die hier niet worden vermeld. Licht altijd uw arts, verpleegkundige of apotheker in over eventuele bijwerkingen waarvan u last krijgt.

Uw arts kan u geneesmiddelen geven om bepaalde bijwerkingen te helpen verminderen. Het is belangrijk dat u ze inneemt precies zoals uw verpleegkundige of apotheker u heeft uitgelegd. Dan is de kans groter dat ze voor u werken. Uw verpleegkundige zal u advies geven over uw bijwerkingen en hoe u ermee kunt omgaan. Na uw behandeling zullen de meeste bijwerkingen beginnen af te nemen.

In deze brochure worden niet alle bijwerkingen van deze behandeling opgesomd. Er bestaan ook enkele zeldzame bijwerkingen die hier niet worden vermeld. Ga voor meer gedetailleerde informatie naar <https://www.e-compendium.be/>.

### BIJWERKINGEN TIJDENS DE BEHANDELING<sup>4</sup>

Sommige mensen krijgen bijwerkingen terwijl ze de behandeling krijgen of kort na de behandeling.

#### **Allergische reactie**

Sommige mensen vertonen een allergische reactie terwijl ze deze behandeling krijgen. Mogelijke tekens van een reactie zijn: het heel warm krijgen of opvliegers, huiduitslag, jeuk, rillen, duizeligheid, hoofdpijn, ademnood, opzwellen van gezicht of mond, of pijn in de rug, in de buik of op de borst.

Uw verpleegkundige zal u tijdens uw behandeling controleren op tekens van een reactie. Als u zich onwel voelt of een van deze tekens vertoont, moet u dat meteen zeggen. Als u allergisch reageert, kunt u snel worden behandeld.

Soms treedt een allergische reactie pas enkele uren na de behandeling op. Als u tekens van een reactie vertoont of zich onwel voelt als u weer thuis bent, moet u onmiddellijk contact opnemen met het ziekenhuis.

## MEEST VOORKOMENDE BIJWERKINGEN



Bijwerkingen van  
chemotherapie



Bijwerkingen van  
immunotherapie



### Risico op infectie (chemotherapie)<sup>3</sup>

Deze behandeling kan het aantal witte bloedcellen in uw bloed doen afnemen. Deze cellen bestrijden infecties. Als u weinig witte bloedcellen hebt, bent u vatbaarder voor infecties. Een verlaagd aantal witte bloedcellen wordt neutropenie genoemd.

Als u een infectie hebt, is het belangrijk die zo snel mogelijk te behandelen. Bel meteen naar het ziekenhuis op het contactnummer dat u hebt gekregen en dat de klok rond bereikbaar is als:

- uw temperatuur oploopt tot meer dan 37,5°C (99,5°F);
- u zich plots onwel voelt, zelfs als uw temperatuur normaal is;
- u symptomen van een infectie vertoont.

Symptomen van een infectie zijn: rillen, keelpijn, hoesten, diarree of vaak moeten plassen.

**Het is belangrijk eventuele specifieke adviezen die u van uw kankerteam kreeg, op te volgen.**

Het aantal witte bloedcellen wordt meestal weer normaal voor uw volgende behandeling. Voordat u nog een behandeling krijgt, zal uw bloed worden onderzocht. Als u weinig witte bloedcellen hebt, kan uw arts uw behandeling voor korte tijd uitstellen.



### Blauwe plekken en bloedingen (chemotherapie)<sup>3,4</sup>

Deze behandeling kan het aantal bloedplaatjes in uw bloed doen afnemen. Bloedplaatjes zijn cellen die uw bloed helpen te stollen.

Licht uw arts in als u blauwe plekken of bloedingen hebt die u niet kunt verklaren. Voorbeelden zijn: neusbloedingen, bloedend tandvlees, of kleine rode of paarse puntjes op de huid die er kunnen uitzien als huiduitslag.

Sommige mensen moeten een infuus met extra bloedplaatjes krijgen. Dit wordt een plaatjestransfusie genoemd.



## Anemie

(chemotherapie)<sup>3</sup>

Deze behandeling kan het aantal rode bloedcellen in uw bloed doen afnemen. Deze cellen brengen zuurstof rond in het lichaam. Als u te weinig rode bloedcellen hebt, kunt u moe en kortademig zijn. Licht uw arts of verpleegkundige in als u zich zo voelt.

Als u heel anemisch bent, kan het zijn dat u een infuus met extra rode bloedcellen moet krijgen. Dit wordt een bloedtransfusie genoemd.



## Misselijkheid

(chemotherapie)<sup>3</sup>

De eerste dagen na deze behandeling kunt u zich misselijk voelen. Uw arts zal u geneesmiddelen tegen misselijkheid geven om uw misselijkheid te helpen voorkomen of onder controle te houden. Neem de geneesmiddelen in precies zoals uw verpleegkundige of apotheker u heeft uitgelegd. Het is gemakkelijker misselijkheid te voorkomen dan het te behandelen als u er al last van hebt.

Als u misselijk bent, moet u kleine slokjes drinken en vaak kleine hoeveelheden eten. Als u zich misselijk blijft voelen, of als u meer dan eens braakt op 24 uur, moet u zo snel mogelijk contact opnemen met het ziekenhuis. Zij zullen u advies geven en kunnen u een ander geneesmiddel tegen misselijkheid geven dat beter voor u werkt.



## Vermoeidheid

(chemotherapie + immunotherapie)<sup>3,4</sup>

Vermoeidheid is een veel voorkomende bijwerking van deze behandeling. Het is vaak erger naar het einde van de behandeling toe en nog gedurende enkele weken erna. Probeer het rustig aan te doen en plan voldoende rustmomenten in. Niet-intensieve beweging, zoals korte wandelingen, kunnen u meer energie geven. Bestuur geen voertuigen en bedien geen machines als u zich slaperig voelt.



## Haaruitval

(chemotherapie)<sup>3</sup>

Met deze behandeling verliest u doorgaans al uw hoofdhaar. Ook uw wimpers, wenkbrauwen of ander lichaamshaar kunnen/kan uitvallen. Haaruitval begint meestal na uw eerste of tweede behandeling.

Hoofdhuidkoeling is een manier om de temperatuur van uw hoofdhuid te verlagen om haaruitval te helpen verminderen. Uw verpleegkundige kan u zeggen of dit een mogelijkheid is voor u.

Uw verpleegkundige kan u vertellen over manieren om met haaruitval om te gaan. Er bestaan manieren om haaruitval te verbergen als u dat wilt. Het is belangrijk dat u uw hoofd bedekt om uw hoofdhuid te beschermen wanneer u in de zon komt.



Haaruitval is meestal tijdelijk en uw haar groeit normaal terug na de behandeling. In zeldzame gevallen is de haaruitval blijvend. Het gebeurt dat het haar niet terugkomt of dunner is dan voor de behandeling. Als u zich hier zorgen over maakt, kunt u er over praten met uw kankerspecialist of verpleegkundige.

## **Diarree of buikpijn** (chemotherapie + immunotherapie)<sup>3,4</sup>

Het is belangrijk het advies over diarree dat u van uw verpleegkundige of arts krijgt, op te volgen. Neem contact op met het ziekenhuis als u diarree hebt. Zij zullen u zeggen wat u er aan kunt doen en of u een dokter moet raadplegen. Ze kunnen u tabletten tegen diarree geven om thuis in te nemen.

Als u lichte diarree hebt, kunt u die normaal onder controle krijgen met tabletten tegen diarree. Bij lichte diarree hebt u tot 4 keer per dag losse stoelgang (poep).

Probeer dagelijks minstens 2 liter vocht te drinken.

Het kan helpen om alcohol, cafeïne, melkproducten, vetrijke en vezelrijke voedingsmiddelen te vermijden.

Licht onmiddellijk het ziekenhuis in als u een van de volgende symptomen vertoont: pijn in uw buik (abdomen), braken, bloed of slijm in uw stoelgang, of koorts.

Mogelijk moet u naar het ziekenhuis voor een infuus of andere behandelingen. Als uw darmen ontstoken zijn (colitis), moet u mogelijk steroïden nemen.

## **Verstopping** (chemotherapie)<sup>3</sup>

Deze behandeling kan verstopping (constipatie) veroorzaken. Deze tips kunnen helpen:

- Drink dagelijks minstens 2 liter vocht.
- Eet vezelrijke voedingsmiddelen, zoals fruit, groenten en volkorenbrood.
- Neem regelmatig rustige lichaamsbeweging. Korte wandelingen zijn ideaal.

Neem contact op met het ziekenhuis voor advies als u last hebt van verstopping. Uw arts kan u geneesmiddelen geven die u kunnen helpen, zogenaamde laxeermiddelen.



## **Pijnlijke mond** (chemotherapie)<sup>3</sup>

U kunt een pijnlijke mond of aften krijgen. Dit kan u vatbaarder maken voor een mondinfectie.

Gebruik een zachte tandenborstel om uw tanden of gebit te reinigen 's morgens, 's avonds en na het eten.

Als uw mond pijnlijk is, moet u uw verpleegkundige of arts inlichten. Zij kunnen u een mondspoeling of geneesmiddelen geven om u te helpen.

U moet ook proberen veel te drinken en alcohol, tabak en voedingsmiddelen die uw mond irriteren, vermijden.



## **Verminderde eetlust** (chemotherapie)<sup>3</sup>

Deze behandeling kan een invloed hebben op uw eetlust. U moet zich geen zorgen maken als u een dag of twee weinig eet. Maar als uw eetlust na enkele dagen niet terugkeert, moet u uw verpleegkundige of diëtist inlichten. Zij zullen u raad geven en kunnen u eventueel ook voedings- of dranksupplementen geven.



## **Veranderingen in smaak** (chemotherapie)<sup>3</sup>

U kunt een bittere of metaalsmaak in uw mond krijgen. Sommige voedingsmiddelen kunnen anders smaken of helemaal geen smaak hebben.

Suikervrije snoepjes opzuigen kan hierbij helpen. Probeer verschillende voedingsmiddelen uit om uit te zoeken wat u het best smaakt.

Veranderingen in de smaak worden na de behandeling meestal beter. Uw verpleegkundige kan u meer advies geven.



## Gevoelloze of tintelende handen of voeten (chemotherapie + immunotherapie)<sup>3,5</sup>

Deze behandeling heeft een invloed op de zenuwen en kan gevoelloze, tintelende of pijnlijke handen of voeten veroorzaken. Het kan voor u moeilijk zijn om knopen vast te maken of andere precieze taken uit te voeren.

Licht uw arts in als u deze symptomen hebt. Mogelijk moet de dosis van het geneesmiddel worden verlaagd.

### Mogelijke vragen<sup>5</sup>:

- Heeft u gevoelloosheid of tintelingen in uw handen of voeten ervaren?
- Voelt u pijn in uw handen en voeten? (scoren op een schaal van 0 tot 10)
- Heeft u het gevoel alsof u handschoenen en kousen draagt?
- Storen deze gewaarwordingen u? Worden ze erger?
- Voelt u zich zwak in uw armen en benen?
- Laat u regelmatig voorwerpen vallen?
- Bent u onlangs gevallen?
- Heeft u moeilijkheden met wandelen of bij het op lopen van een trap?
- Belemmeren deze gevoelens uw werk of uw dagelijkse activiteiten?

De symptomen verbeteren doorgaans traag na de behandeling. Bij sommige mensen gaan ze echter nooit meer weg. Praat met uw arts als u zich hierover zorgen maakt.

## **Veranderingen in hormoonconcentraties** (immunotherapie)<sup>4</sup>

Deze behandeling kan sommige klieren die hormonen aanmaken, doen ontsteken. Klieren die kunnen worden aangetast, zijn de schildklier, de hypofyse en de bijnieren. Als een klier is aangetast, kan de concentratie van de hormonen die deze klier aanmaakt veranderen. Een bloedtest brengt veranderde hormoonconcentraties meestal aan het licht voordat u symptomen krijgt.

Licht uw arts in als u een van de volgende symptomen vertoont: hoofdpijn die niet verdwijnt, extreme vermoeidheid of slaperigheid, het koud hebben, gewichtstoename, duizeligheid of flauwvallen, of veranderingen in gedrag of stemming, zoals prikkelbaarheid of verwardheid.

Deze bijwerkingen kunnen aanhouden na uw behandeling. Mogelijk moet u bloedonderzoeken ondergaan om na te gaan of u een behandeling nodig hebt om uw hormoonconcentraties te regelen.

## **Veranderingen in het gehoor** (chemotherapie)<sup>3</sup>

Deze behandeling kan veranderingen in het gehoor veroorzaken, waaronder gehoorverlies. U kunt last krijgen van oorsuizen. Dit wordt tinnitus genoemd. Het is ook mogelijk dat u niet langer bepaalde hoge tonen kunt horen. Veranderingen in het gehoor worden doorgaans beter na deze behandeling, maar sommige veranderingen kunnen blijvend zijn. Neem contact op met uw arts als u veranderingen in uw gehoor opmerkt.

## **Oogproblemen** (chemotherapie + immunotherapie)<sup>3,4</sup>

Uw ogen kunnen waterig worden en pijnlijk aanvoelen. Uw arts kan u geneesmiddelen geven om bepaalde bijwerkingen te helpen verminderen. Als uw ogen rood en ontstoken worden (conjunctivitis), moet u uw arts inlichten. Mogelijk hebt u oogdruppels met antibiotica nodig.

Licht onmiddellijk uw arts of verpleegkundige in als u pijn in uw ogen hebt of als u veranderingen in uw gezichtsvermogen opmerkt.

## **Pijnlijke gewrichten of spieren** (chemotherapie + immunotherapie)<sup>3,4</sup>

U kunt gedurende enkele dagen na de behandeling last hebben van pijnlijke spieren of gewrichten. Licht in dat geval uw arts in, zodat die u pijnstillers kan voorschrijven. Licht uw arts of verpleegkundige in als de pijn niet afneemt. Een warm bad nemen en regelmatig rusten kan helpen.



## Effecten op het hart

(chemotherapie)<sup>3</sup>

Deze behandeling kan een invloed hebben op de werking van uw hart. Mogelijk moet u tests ondergaan om te kijken hoe goed uw hart werkt. Deze tests kunnen plaatsvinden voor, tijdens en soms na de behandeling. Als de behandeling hartproblemen veroorzaakt, kan uw arts het type chemotherapie dat u krijgt veranderen.

Neem onmiddellijk contact op met een arts als u:

- pijn of een drukkend gevoel op de borst hebt;
- kortademig of duizelig bent;
- het gevoel hebt dat uw hart te snel of te traag klopt.

Ook andere aandoeningen kunnen deze symptomen veroorzaken, maar het is belangrijk dat u ze laat controleren door een arts.



## Effecten op de longen

(chemotherapie + immunotherapie)<sup>3,4</sup>

Sommige mensen kunnen kortademig worden of beginnen te hoesten met deze behandeling.

Licht onmiddellijk uw arts in als u last krijgt van een piepende ademhaling, hoesten, koorts of kortademigheid. U moet uw arts of verpleegkundige ook op de hoogte brengen als bestaande ademhalingsproblemen erger worden. Zij kunnen u geneesmiddelen geven om u te helpen. Ze kunnen u tests laten ondergaan om uw longen te controleren.



## Hoge bloeddruk

(immunotherapie)<sup>4</sup>

Deze behandeling kan hoge bloeddruk (hypertensie) veroorzaken. Uw arts of verpleegkundige zal regelmatig uw bloeddruk meten. Als die hoog is, zullen ze u zeggen wat u moet doen.



## Veranderingen in de huid

(chemotherapie + immunotherapie)<sup>3,4</sup>

Deze behandeling kan veranderingen in de huid veroorzaken, zoals rode vlekken of jeukende huiduitslag. Dit is een veel voorkomende bijwerking. Licht altijd uw arts of verpleegkundige in als u huidveranderingen opmerkt. Zij kunnen u advies geven en crèmes of geneesmiddelen voorschrijven om u te helpen.

Sommige mensen ontwikkelen een ernstige huidreactie, maar dit komt minder vaak voor. Het kan dan gaan om grote blaren, een schilferende huid of wondjes in uw mond. U kunt ook koorts (hoge temperatuur) hebben. Als u een ernstige reactie

vertoont, moet u onmiddellijk contact opnemen met het ziekenhuis en moet u waarschijnlijk in het ziekenhuis worden behandeld.

Tijdens de behandeling en nog gedurende enkele maanden erna zult u gevoeliger zijn voor de zon. Uw huid kan sneller verbranden dan normaal. Gebruik een crème met een hoge beschermingsfactor (SPF) en bedek u met kleding en een hoed.



## Veranderingen in de nagels (chemotherapie)<sup>3</sup>

Uw nagels kunnen trager groeien of gemakkelijker breken. U kunt witte lijntjes op uw nagels opmerken, of andere veranderingen in de vorm of kleur van uw nagels. Zodra de behandeling beëindigd is, groeien veranderingen in uw nagels er doorgaans op enkele maanden weer uit.

Dit kunt u doen om uw nagels te verzorgen:

- Houd uw nagels en handen vochtig.
- Draag handschoenen om uw nagels te beschermen als u dingen doet in huis of in de tuin.
- Gebruik tijdens deze behandeling geen valse nagels. Nagellak kan wel.
- Als uw teennagels aangetast zijn, draagt u het best goed zittende schoenen om ze te beschermen.



## Effecten op de nieren (chemotherapie + immunotherapie)<sup>3,4</sup>

Deze behandeling kan een invloed hebben op de werking van uw nieren. Deze bijwerking is meestal niet ernstig en verdwijnt na de behandeling. U zult bloedonderzoeken ondergaan om te controleren hoe goed uw nieren werken.

Het is belangrijk om dagelijks minstens 2 liter te drinken om uw nieren te helpen beschermen.



## Hoofdpijn (chemotherapie + immunotherapie)<sup>3,4</sup>

Deze behandeling kan hoofdpijn veroorzaken. Als dit gebeurt, moet u uw arts of verpleegkundige inlichten. Zij kunnen u pijnstillers geven.



**Deze brochure kan medisch advies niet vervangen. Dit is een niet-volledige lijst van de meest voorkomende bijwerkingen.**

**Bespreek elke bijwerking waarvan u last hebt met uw arts of verpleegkundige.**

Vink de bijwerkingen aan die u sinds uw laatste opname hebt gehad.

BIJWERKINGEN OF SYMPTOMEN	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5
<b>Tekens van infectie</b> (koorts, vaak plassen)					
<b>Blauwe plekken en bloedingen</b>					
<b>Misselijkheid</b>					
<b>Diarree</b>					
<b>Verstopping</b>					
<b>Pijnlijke mond</b>					
<b>Verminderde eetlust</b>					
<b>Veranderingen in smaak</b>					
<b>Gevoelloze of tintelende handen of voeten</b>					
<b>Hormoonschommelingen</b> (hoofdpijn, extreme vermoeidheid, slaperigheid, rillerig gevoel, gewichtstoename, duizeligheid, stemmingswisselingen)					
<b>Oogproblemen</b>					
<b>Veranderingen in de nagels</b>					
<b>Pijnlijke gewrichten of spieren</b>					
<b>Hartproblemen</b> (pijn of een beklemmend gevoel op de borst, hart dat te snel of te traag klopt)					
<b>Longproblemen</b> (hoesten, piepende ademhaling)					
<b>Hoge bloeddruk</b>					
<b>Veranderingen in de huid</b> (jeuk, huiduitslag)					
<b>Hoofdpijn</b>					
<i>Meld elke mogelijke bijwerking die niet op deze lijst staat aan uw arts of verpleegkundige.</i>					

#### Referenties:

1. Kanker.nl. Immunotherapie bij longkanker. Beschikbaar op: <https://www.kanker.nl/kankersoorten/longkanker/behandeling/immunotherapie-bij-longkanker> [Geraadpleegd in juni 2021].
2. Macmillan Cancer Support. Chemotherapy. Beschikbaar op: <https://www.macmillan.org.uk/cancer-information-and-support/treatment/types-of-treatment/chemotherapy> [Geraadpleegd in juni 2021].
3. Macmillan Cancer Support. Paclitaxel and carboplatin. Beschikbaar op: <https://www.macmillan.org.uk/cancer-information-and-support/treatments-and-drugs/paclitaxel-and-carboplatin> [Geraadpleegd in juni 2021].
4. Macmillan Cancer Support. Pembrolizumab. Beschikbaar op: <https://www.macmillan.org.uk/cancer-information-and-support/treatments-and-drugs/pembrolizumab> [Geraadpleegd in juni 2021].
5. Stubblefield MD et al. J Natl Compr Canc Netw. 2009;7(Suppl 5): S1-S26





# NOTA'S

---



# NOTA'S

---

